

**ОП «Политология», 2019-20****Математика и статистика, часть 2****Описание выборок – часть 1. (10.04.2020)***А. А. Макаров, А. А. Тамбовцева, Н. А. Василёнок***Задача 1.**

(а) Дана выборка:

0 0 2 2 2 0 0 2

Может ли эта выборка быть правдоподобной (репрезентативной) выборкой из биномиального распределения с параметрами  $n = 2$ ,  $p = 0.5$ ? Обоснуйте свой ответ.

**Решение.**

Биномиальная величина  $X \sim \text{Binom}(n = 2; p = 0.5)$  описывает число успехов в серии из двух испытаний Бернулли. В данном случае эта случайная величина описывает количество выпавших орлов в двукратном подбрасывании правильной монетки. Запишем закон распределения случайной величины  $X$ :

X	0	1	2
p	0.25	0.5	0.25

Исходы двукратного подбрасывания монетки: ОО, ОР, РО, РР. Вероятности соответствующие.

Вероятности отдельных значений биномиальной случайной величины можно было бы рассчитать и по формуле:

$$P(X = k) = C_n^k \times p^k \times (1 - p)^{(n-k)}.$$

Получаем:

$$P(X = 0) = C_2^0 \times 0.5^0 \times 0.5^2 = 0.25;$$

$$P(X = 1) = C_2^1 \times 0.5^1 \times 0.5^1 = 0.5;$$

$$P(X = 2) = C_2^2 \times 0.5^2 \times 0.5^0 = 0.25.$$

Доля каждого из возможных значений случайной величины в нашей выборке должна быть близка к теоретической вероятности соответствующих значений. Примерно 50% выборки должны составлять значения 1, и по 25% – 0 и 2 (допустимы небольшие отклонения, особенно на маленькой выборке).

Однако мы видим, что в выборке нет ни одного значения 1, а значения 0 и 2 распределились примерно поровну. Скорее всего, такая выборка не является правдоподобной выборкой из заданного распределения.

(b) Дана выборка:

−20 25 5 78 27 16 −11 10 18

Может ли предложенная выборка быть правдоподобной (репрезентативной) выборкой из нормального распределения  $N(2, \sigma^2 = 16)$ ? Обоснуйте свой ответ.

**Решение.**

Вспомним, что: а) нормальное распределение симметрично относительно среднего; б) для него работает «правило трех сигм». Давайте рассчитаем, чему равны границы одного, двух и трех стандартных отклонений от среднего для данного распределения.

В пределах 1 стандартного отклонения от среднего находится примерно 68% выборки:

$$[2 - \sqrt{16}; 2 + \sqrt{16}] = [-2; 6].$$

В пределах 2 стандартных отклонений от среднего находится примерно 95% выборки:

$$[2 - 2 \times \sqrt{16}; 2 + 2 \times \sqrt{16}] = [-6; 10].$$

Следовательно, на промежутки  $[-6; -2) \cup (6; 10]$  приходится  $95 - 68 = 27\%$  выборки. Наконец, в пределах 3 стандартных отклонений должна находиться почти вся выборка (99.8%):

$$[2 - 3 \times \sqrt{16}; 2 + 3 \times \sqrt{16}] = [-10; 14].$$

Но в данной нам выборке **только 2** значения (выделены красным) укладываются в границы 3 стандартных отклонений! Следовательно, данная выборка не является правдоподобной для рассматриваемого распределения.

Можно также было говорить про симметричность относительно среднего, но одного этого свойства все-таки недостаточно.

**Задача 2.** Дана выборка:

8 5 7 10 12 30 4 2 8

(a) Найдите медиану выборки.

Упорядочим выборку по возрастанию:

2 4 5 7 8 8 10 12 30

Медиана выделена синим:

$$Me = x_{0.5} = 8.$$

(b) Найдите нижний и верхний квартили выборки.

«Меньшая» подвыборка, нижняя половина выборки:

2 4 5 7 8.

Нижний квартиль – медиана «меньшей» подвыборки – выделен синим:

$$Q_1 = x_{0.25} = 5.$$

«Большая» подвыборка, верхняя половина выборки:

8 8 10 12 30.

Верхний квартиль – медиана «большей» подвыборки – выделен синим:

$$Q_3 = x_{0.75} = 10.$$

(c) Проверьте, есть ли в выборке нетипичные наблюдения (выбросы). Если есть, укажите их.

Рассчитаем границы характерных значений:

$$[x_{0.25} - 1.5 \times (x_{0.75} - x_{0.25}); x_{0.75} + 1.5 \times (x_{0.75} - x_{0.25})]$$

$$[5 - 1.5 \times (10 - 5); 10 + 1.5 \times (10 - 5)]$$

$$[-2.5; 17.5]$$

Одно наблюдение в нашей выборке – 30 – оказалось выходящим за границы типичных значений. Оно и будет выбросом.